

NOUVEAUX RHIPICERIDÆ [ COL. ],

PAR M. M. PIC.

Les nouveautés ci-dessous décrites font partie des collections du Muséum National de Paris.

*Callirrhapis costata* nov. sp. ♂.

*Elongata, parum nitida, parum dense et uniformiter griseo pubescens, nigra, abdomine rufo.*

Allongé, peu brillant, revêtu d'une pubescence grise, courte, uniforme et peu serrée, noir avec l'abdomen roux. Tête courte, densément et irrégulièrement ponctuée, impressionnée au milieu, peu creusée entre les yeux qui sont grands; antennes atteignant le milieu des élytres, à longues lamelles moins foncées que les articles de la base, 1<sup>er</sup> long et arqué, 2<sup>o</sup> bien visible; prothorax assez court et peu large, un peu rétréci en avant, sinué sur les côtés avec les angles postérieurs presque droits, fortement et densément ponctué, à sillon médian terminé dans une impression basale et une faible impression ponctuée, de chaque côté du milieu; écusson oblong, peu ponctué; élytres longs, pas plus larges que le prothorax, à bords relevés en côtes, sinués sur les côtés, atténués à l'extrémité, ornés d'une côte présuturale antérieure courte et de 4 côtes bien nettes, réunies d'abord deux à deux en dessous du milieu pour ne laisser subsister ensuite que les deux internes qui elles-mêmes se réunissent un peu plus bas, ponctuation forte, irrégulière, en partie mélangée de plis; pattes moyennes, cuisses épaissies.

Longueur : 24 millim. — Presqu'île de Malacca : Tapah Perak (G. B. Ceruti, 1900.)

Cette grande espèce se rapproche de *C. tonkinea* Pic et s'en distingue, à première vue, par les côtes élytrales très marquées toutes, mais diversement, jointes en arrière et les antennes plus longues.

*Callirrhapis Morgani* nov. sp. ♀.

*Elongata, parum nitida, supra glabra, rufescens, elytris castaneis.*

Allongé, peu brillant, dessus glabre, dessous à pubescence espacée grise, roussâtre, élytres châtons, un peu roussâtres par places. Tête courte, irrég-

gulièremment et densément ponctuée, un peu excavée en avant avec le bord surélevé entaillé au milieu, yeux grands; antennes un peu plus longues que le prothorax, longuement pectinées, à 1<sup>er</sup> article robuste, en massue, 2<sup>o</sup> peu distinct; prothorax court et large, rétréci en avant, sinué sur les côtés, à angles postérieurs presque droits, à ponctuation forte et dense, marqué d'une faible dépression antérieure, de deux petites impressions discales et de 2 fossettes profondes et allongées au milieu de la base, côtés un peu creusés; écusson grand, finement et assez densément ponctué; élytres longs, de la largeur du prothorax, subsinués sur les côtés, atténués postérieurement, à rebord surélevé, à ponctuation moyenne, rapprochée, un peu irrégulièrement disposée et des côtes discales à peine indiquées; pattes moyennes, cuisses peu épaissies.

Longueur : 17 millim. — Malacca (de Morgan). Peut se placer près de *C. suturalis* Wat., s'en distingue par la coloration roussâtre de l'avant-corps jointe à la structure du prothorax.

CALLIRRHIPIS RUFESCENS V. NOV. **obscurior** ♀.

*Elongata, supra glabra, nitida, rufa aut brúnnea, articulo 1° antennarum, capite, thorace elytrisque nigris, sutura pro parte rufa; capite diverse punctato, postice sulcato, antice transverse impresso; antennis brevibus, sat longe pectinatis; thorace parum breve, antice valde attenuato, antice profunde sulcato, in disco et postice bifoveolato, postice tri impresso, fortiter sat dense punctato; elytris elongatis, subparallelis, apice attenuatis sat distincte 4 costatis, costis internis postice junctis, media postice ad suturam prolongata, mediocre parum dense et irregulariter punctatis, epipleuris luteo ciliatis.*

Longueur : 22 millim. — Brésil : environs de Jaragua (E. Gounelle, 1915.)

Plus grand que la forme type avec les élytres plus foncés.

Très distinct de *C. angustata* Pic ♀ par la forme plus large, le prothorax plus robuste, autrement impressionné.

PTORTHOCERA CALVA Champ. ♀ [sexe inconnu.]

*Elongata, convexa, supra glabra, rufescens, articulo 1° antennarum, capite, thorace elytrisque nigris; capite diverse punctato, postice et antice impresso, oculis sat grandis; antennis brevibus, articulo 1° elongato, apice curvato, 2° breve, 3° triangulare, 4° et sequentibus brevibus, apice longe dentatis, ultimo elongato; thorace parum breve, antice paulo attenuato, lateraliter sinuato, angulis distinctis, parum punctato, medio sulcato et postice medio paulo impresso, lateraliter oblique subsulcato; elytris thorace paulo*

*laticornibus, lateraliter sinuatis, apice attenuatis, striato-punctatis, intervallis costatis, costis postice pro parte junctis.*

Longueur : 13 millim. — Mexique (Guillemin, 1865.)

Cette espèce, caractérisée par la structure des antennes et la sculpture élytrale, se distingue, à première vue, des ♀ que je connais du genre *Callirrhapis* Latr. par les élytres présentant des côtes nombreuses alternées avec des stries larges et assez profondément, mais irrégulièrement, ponctuées.

**SIMIANIDES LAPORTEI** v. nov. **Bocourti.**

*Niger, capite antice breve thoraceque rufis, illo medio nigro lineato.*

Mexique (Bocourt, 1865.)

Voisin de la var. *atripennis* Pic, dont l'avant-corps est concolore, roux, en diffère par la tête presque entièrement noire et le prothorax roux, à bande médiane noire.

**Simianellus Cerrutii** nov. sp. ♂.

*Angustatus, nitidus, sparse et regulariter griseo pubescens, rufus.*

Étroit, brillant, à pubescence grise espacée et régulièrement disposée, entièrement roux avec les rameaux flabellés des antennes un peu rembrunis. Tête peu courte, à ponctuation moyenne, un peu écartée, yeux assez gros; antennes assez grêles, longues, dépassant le milieu du corps, à articles 3 et suivants assez courts et munis de minces et longs rameaux flabellés, en partie recourbés; prothorax assez court et peu large, peu rétréci en avant, ponctué comme la tête, à large fovéole médiane postérieure et impression arquée sur les côtés, angles postérieurs peu saillants; écusson large, peu ponctué; élytres de la largeur du prothorax, longs, atténués et subacuminés au sommet, à rangées de gros points avec les intervalles étroits, pattes peu longues, cuisses un peu épaissies.

Longueur : 12 millim. — Presqu'île de Malacca : Tapah Perak (G. B. Cerruti, 1900.)

Voisin de *S. (Ennometes olim) malaccanus* Pic, en diffère par les membres roux, les pattes moins robustes, la ponctuation espacée de l'avant-corps, etc.

**Simianus Pasteuri** n. sp. ♂.

*Elongatus, nitidus, sparse et regulariter pubescens, niger, abdomine femoribusque pro parte rufis, capite thoraceque rufis, nigro maculatis, scutello elytrisque testaceis, his apice nigro marginatis.*

Allongé, brillant, à pubescence grise espacée et régulièrement disposée, noir en dessous et roux sur les membres avec partie des cuisses et abdomen roux, avant-corps roux, maculé de noir, élytres testacés, à étroite bordure apicale noire. Tête peu courte, à ponctuation dense, sillonnée sur le vertex, maculée de noir entre les yeux qui ne sont pas très grands mais bien saillants; antennes grêles et pas très longues, à 1<sup>er</sup> article très arqué, 2<sup>e</sup> court, 3<sup>e</sup> et suivants longs et munis à leur base d'un long rameau grêle, celles-ci noires, marquées de roux par places; prothorax peu court, très rétréci en avant, à angles postérieurs marqués, densément ponctué, sillonné antérieurement au milieu, triimpressionné postérieurement et marqué de noir sur son milieu postérieur; écusson un peu allongé, peu ponctué, testacé, foncé à l'extrémité; élytres de la largeur du prothorax, pas très longs, atténués à l'extrémité, faiblement costés intérieurement avec les intervalles ayant une double rangée de points; pattes moyennes, cuisses très ciliées en dessous, foncées avec les cuisses teintées de roux sur leur milieu.

Longueur : 11 millim. — Java (J. D. Pasteur.)

Voisin de *S. bicoloripes* Pic, en diffère par le prothorax plus étroit, maculé de noir et moins fortement impressionné, le 1<sup>er</sup> article des antennes noir, les élytres avec quelques côtes bien nettes et bordés de noir à l'apex.

*SIMIANUS APICALIS* v. nov. *lateapicalis* ♀.

*Rufus, antennis pro parte elytrisque apice late nigris, his fortiter costatis.*

Java (J. D. Pasteur.)

Diffère de la forme type par les élytres plus largement noirs au sommet et munis de côtes plus saillantes avec les antennes à premiers rameaux presque entièrement noirs, au lieu d'être presque entièrement testacés.

*Ennometes obscurus* n. sp. ♂.

*Elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, niger, elytris castaneis, abdomine pedibusque pro parte rufis.*

Allongé, brillant, à pubescence grise espacée, noir, avec les élytres moins foncés, pattes en partie et abdomen roux. Tête courte, fortement ponctué, sillonnée postérieurement, à peine impressionnée en avant, yeux assez gros; antennes assez courtes, un peu grêles, à articles 3 et suivants un peu allongés et munis d'un assez long rameau étroit; prothorax peu court, subarqué en avant, un peu étranglé vers le milieu sur les côtés, faiblement sillonné en avant, bifoveolé au milieu et impressionné postérieurement devant l'écusson, à ponctuation forte et rapprochée; écusson

subovalaire, peu ponctué; élytres de la largeur du prothorax, pas très longs, atténués postérieurement avec des rangées de points forts entremêlés de plis et des traces de costules; pattes assez grêles.

Longueur : 12 millim. — Tonkin : Région d'Ha-Giang (S. Olivier, 1916.)

Très distinct de *E. Rouyeri* Pic par les rameaux des antennes plus courts, la forme moins élancée, la ponctuation moins régulière des élytres.

**Rhipicera Donckieri** n. sp. ♂ ♀.

*Elongata, parum, nitida, pro parte dense-griseo aut luteo pubescens, rufescens aut nigro picea, elytris pro parte denudatis; ♂ antennis brevibus, multiflabellatis, ♀ antennis gracilibus, pectinatis.*

Allongé, peu brillant, paraissant même opaque en partie par suite de la pubescence grise, ou jaunâtre, très dense par places, un peu interrompue aux élytres, qui recouvre cette espèce, coloration roussâtre, parfois noire de poix par places. Tête assez grosse, finement et densément ponctué, plus courte chez ♂, yeux grands, mandibules noires; antennes courtes, en forme d'éventail ♂, de 24 articles, à rameaux flabellés, 3-6 et derniers plus courts que ceux du milieu, celles-ci grêles chez ♀, peu longues, pectinées avec les derniers articles resserrés; prothorax assez large, un peu moins court chez ♀ que chez ♂, finement et densément ponctué, sillonné au milieu, bifovéolé de chaque côté au milieu, les fossettes au dessus l'une de l'autre, plus densément pubescent sur les côtés avec les angles postérieurs saillants en dehors; écusson densément pubescent; élytres un peu plus larges que le prothorax, sinués sur les côtés, faiblement surélevés vers la base, un peu plus longs chez ♀ que chez ♂, courtement atténués et subacuminés au sommet, ornés de 4 côtes en partie jointes en arrière, pubescentes à l'état frais, à ponctuation irrégulière, plus forte chez ♂ et pubescence grise non absolument continue, laissant quelques places qui, de loin, apparaissent foncées d'aspect un peu moucheté; dessous du corps régulièrement pubescent; pattes assez grêles, tarses élargis chez ♂.

Longueur : 15-17 millim. — Australie (ex Donckier, 1923.)

Sans doute à placer dans le s. g. *Oligorhipis* Guer., très distinct, à première vue, de *O. vetusta* Gory par la forme non ramassée du corps.

**Sandalus Posthi** nov. sp. ♂ <sup>(1)</sup>.

*Oblongus, parum nitidus, uniformiter griseo pubescens, rufus, aliquot pro parte paulo brunnescens; thorace postice valde dilatato; elytris irregulariter punctatis, fere indistincte costulatis.*

(1) Cette espèce figure aussi dans ma collection.

Oblong, peu brillant, revêtu d'une pubescence uniforme grise, roux ou brunâtre par places. Tête longue, densément ponctuée, excavée entre les yeux et munie d'une saillie au-dessus des antennes qui n'atteignent pas la base du prothorax; prothorax court et large, fortement dilaté postérieurement avec les angles nuls, sillonné au milieu, impressionné aux extrémités, bifovéolé sur le disque, finement et densément ponctué; écusson nettement ponctué; élytres un peu plus larges que le prothorax, pas très longs, atténués à l'extrémité, à ponctuation irrégulière et dense, ornés de 3 ou 4 côtes discales, en partie courtes et peu marquées; pattes moyennes, tibias arqués ou sinués, denticulés extérieurement.

Longueur : 16 millim. — Côte d'Ivoire : région du N'Ji (Cap. Posth, 1911.)

Voisin de *S. castanescens* Fairm., en diffère, à première vue, par les antennes plus courtes, ne dépassant pas le bord du prothorax.